



Rasbeschrijving Consumptie

LEONARDO

TRA89-462 x Bolesta

Eigenschappen

Rijptijd	Middenvroeg
Opbrengst	Goed
Grofheid	Grof
Knolvorm	Rondovaal / Ovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Donker geel
Schilkleur	Donker geel
Besvorming	Geen
Kiemrust	Vrij kort
Opkomst	Normaal
Loofontwikkeling	Goed
Onderwatergewicht	410

Resistenties

Aardappelmoeheid	Resistent Ro1,2/3
	Vrij resistent Ro 4
	Resistent Palida 2
Wratziekte	Resistent fysio 1
Kringrigheid	Vatbaar
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Vatbaar
Y-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus tolerantie	Matig gevoelig

Teeltadvies

Bodem : Geschikt voor lichte tot zware kleigronden.

<u>Plantafstand voor fritesaardappelen</u> :	28/35	24-26 cm
⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	35/45	32-34 cm
uitgaande van een rijafstand van 75 cm	45/55	37-39 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Leonardo heeft een ruime N-behoefte (vergelijkbaar met Bintje). 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 direct na de knolzetting.
- Extra fosfaat en kali bemesting is niet noodzakelijk. Behoefte af laten hangen van het advies na grondbemonstering. Een goed Magnesium en Mangaangehalte is van belang.

Bewaring : Geschikt voor lange bewaring (bewaartemperatuur ongeveer 7°C).

Kiemremming : Gevoelig voor schilbrand. Na de wondheling, tijdig met het inzetten van kiemremmer (CIPC gassen) beginnen.

Voorzorgsmaatregelen : Vrij gevoelig voor interne bruinverkleuring, weinig gevoelig voor Sencor.

Andere opmerkingen : Leonardo groeit hoog in de rug. Voldoende diep planten om groene knollen te voorkomen.