



Eigenschappen

▪ Afrijping	4 (laat)
▪ Schilkleur	geel
▪ Vleeskleur	lichtgeel
▪ Vorm	ovaal
▪ Aantal kn/pl	14
▪ Grofheid	7
▪ Stootblauw	5
▪ Rooibeschatiging	5
▪ Rel. opbrengst	hoog
▪ OWG	500
▪ Phytophthora-loof	6,5
▪ Phytophthora-knol	7
▪ Alternaria	5
▪ Schurft	7
▪ Ro 1/2/3/4, Pa2/3	HR
▪ Wratziekte f1, 6, 18	R
▪ Kringerigheid	5
▪ Kiemrust	8
▪ Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden

(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug
35/50	35 (38.500 pl/ha)
50/55	39 (34.000 pl/ha)

Bemesting

(Standaard is advies bodemanalyse)

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassing	
		1 ^e	2 ^e
N	80	2/3	1/3
P ₂ O ₅	100	4/4	
K ₂ O	120	3/4	1/4
MgO	70 kg/ha		

Aandachtspunten

- Poters in het witte puntjes stadium in een goede structuur poten.
- Zorg voor een goede rugopbouw.
- Saprodi is niet gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na de knolzetting.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Preventieve Alternaria bestrijding wordt aanbevolen.
- Doodgespoten perceel goed laten afharden. Saprodi is gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 6 °C bewaren.