

Eigenschappen

▪ Afrijping	5,5 (middenlaat)
▪ Schilkleur	geel
▪ Vleeskleur	lichtgeel tot geel
▪ Aantal kn/pl	7-9
▪ Grofheid	8
▪ Stootblauw	6
▪ Rooibeschadiging	4,5
▪ Rel. opbrengst	Vrij hoog
▪ OWG	390-395
▪ Phytophthora-loof	5
▪ Phytophthora-knol	5,5
▪ Schurft	5,5
▪ Ro 1,2,3,4 Pa2,3	R
▪ Wratziekte f1,6	R, WV
▪ Kringerigheid	5,5
▪ Kooktype	B
▪ Frites	8
▪ Kiemrust	8
▪ Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden

(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug
28/35	21-22 (60.000 pl/ha)
35/50	29-32 (45.000 pl/ha)
50/55	35-37 (37.000 pl/ha)
50-60 gesneden	29-32 (45.000 pl/ha)

Bemesting

(Standaard is advies bodemanalyse)

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassing	
		1 ^e	2 ^e
N	100	3/4	1/4
P ₂ O ₅	100	4/4	
K ₂ O	120	4/4	

Aandachtspunten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst laten opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Plant niet te vroeg!
- Poot 2 cm onder het maaiveld.
- Lugano is niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
- 2^e N gift na de knolzetting.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden.
- Doodgespoten perceel goed laten afharden, **Lugano is gevoelig voor rooibeschadiging.**
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van minimaal 7°C bewaren .
Geen Ethyleen als kiemremmer gebruiken.