

# Description variétale

## Miranda



### Caractéristiques

▪ Précocité	7,5 (précoce)	▪ Mildiou - tubercule	6,5
▪ Couleur de peau	Jaune	▪ Gale	7
▪ Couleur de chair	Jaune clair	▪ Nématodes Ro 1, 4	Résistant
▪ Tubercules par pied	10-12	▪ Galle verruqueuse f1	Résistant
▪ Grosseur des tubercules	7,5	▪ Virus rattle du tabac TRV	7
▪ Coups bleus	7	▪ Type de cuisson	B
▪ Endommagements	6	▪ Fritabilité	8
▪ Rendement	Élevé	▪ Dormance	8
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	21,2 / 390-395	▪ Conservation	7
▪ Mildiou - feuillage	4,5		

### Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre buttes	75 cm entre buttes	Densité
35/50	29-31 cm	32-36 cm	40.000 pl./ha
50/60 (plant coupé)	26-29 cm	31-33 cm	42.000 pl./ha

Dans les sols argileux plus lourds, planter un peu plus dense.

### Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application	
		1 <sup>ère</sup>	2 <sup>e</sup>
N	100	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4	
K <sub>2</sub> O	100	4/4	

Un ajout supplémentaire de magnésium et manganèse est recommandé tôt dans la saison de culture.

### Précautions

- Plantation au stade « points blancs ». Ne pas planter trop tôt !
- Planter à 2 cm sous le niveau du sol en prévention de l'apparition de verdissement
- La Miranda est moyennement sensible au Sencoral.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal. Commencer à temps la pulvérisation préventive contre l'alternariose. L'utilisation d'hydrazide maléique est recommandée pour une conservation prolongée.
- 2e application d'azote peu après tubérisation.
- Avant l'arrachage, la peau doit être bien formée en prévention des endommagements mécaniques.
- Convient tant pour la livraison départ champs que pour la conservation jusqu'à avril à 7 °C.